


ГЕММОРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА (ГЛПС) В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ДОКЛАДЧИК

БАТЮК Н.А.

Заболеваемость ГЛПС в пересчете на 100 тыс. населения


в период 2006-2010гг




Условия заражения ГЛПС в Ашинском районе за 2008-2010 годы (удел-ый вес)




Средние показатели степени тяжести ГАПС за период 2008 – 2010гг.




Распределение заболевших ГАПС по полу (показатель в % отношении)



Распределение заболевших ГЛПС по возрасту за 2008 – 2010 гг.



Течение ГЛПС по возрастной структуре , в % ОТНОШЕНИИ




Результаты изучения клинических особенностей ГЛПС в Ашинском МР по материалам историй болезни за 2010г. (72 историй болезни)

Клинические проявления	Кол-во	%
Общеклиническая симптоматика	72	100
Острое начало	72	100
по $\uparrow t^0$ до $38,5^0$ С	36	50
по $\uparrow t^0$ до 40^0 и выше	41	56,9
длительность лихорадочного периода 3-4 дня	20	27,7
5-6 дней	31	43,1
7 дней и более	26	36,1
общая слабость	72	100
озноб	64	85,3
сухость во рту	68	94,4

жажда	54	75
боли в животе	36	50
тошнота	59	81,9
рвота	30	41,7
икота	11	15,3
нарушения зрения	27	37,5
брадикардия	27	37,5
снижение артериального давления	15	20,8
геморрагии на коже и слизистых	42	58,3

носовое кровотечение	5	6,9
желудочно-кишечное кровотечение	2	2,7
маточное кровотечение	-	-
головные боли	70	97,2
бессонница	22	30,5
судорожный синдром	-	-
боли в пояснице	70	97,2
положительный синдром Пастернацкого	69	95,8
острая почечная недостаточность	7	9,7
снижение диуреза	42	58,3
олиурия	6	8,3
анурия	1	1,4
помурия	35	45,6
протеинурия	69	95,8
мочевина крови до 10 мм/п	49	68,1
до 10-20,0 мм/п	21	29,2
до 20 и выше	6	8,3
креатинин крови до 120 мм/п	48	67,6
120 и выше	29	40,3
изостенурия	30	41,7
микрогематурия	62	86,1
цилиндрурия	41	56,9

% лабораторного подтверждения ГЛПС



Исходные ГЛПС в период 2008 – 2010гг.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!